

مدد علی زنان میرآبادی

رئیس مجتمع تحقیقات کاربردی و تولیدی

شرکت توسعه کشت و زراعتی رومانی



## کمبود گوگرد در کلزا

گوگرد ممکن است رنگدانه‌های ارغوانی با شدت بیشتری در قسمت‌های زیرین برگ مشاهده شود. همچنین با گذشت زمان و تدوام شرایط کمبود گوگرد برای گیاه، بر ضخامت برگ‌ها افزوده و آنها حالت لوله‌ای به خود می‌گیرند.

گیاهان دارای علائم کمبود گوگرد، نسبت به گیاهان سالمی که کنوبی به حالت ایستاده و عمودی دارند، به صورت افتاده و خوابیده قابل مشاهده هستند.

در شرایط حادتر، رگبرگ میانی هم در قسمت زیرین به بنفس تغییر رنگ می‌دهد.



علائم کمبود گوگرد در شکل و بافت برگی گیاه کلزا بسیار مشهودتر از سایر کمبودها می‌باشد.

در ابتدا رشد برگ‌ها و گیاه بدون هر گونه تغییری در ظاهر کاهش می‌یابد اما با پیتر شدن گیاه علائم مشخصی نمایان می‌شود. برگ‌های دارای کمبود گوگرد به زرد مایل به سبز تغییر رنگ داده و نسبت به برگ‌های سالم ضخیم‌تر می‌شوند. حالت دندانه‌ای در لبه‌های برگ به طور مشخص در اثر کمبود این عنصر مشاهده می‌شود.



به تدریج رنگدانه‌های ارغوانی ممکن است در قسمت بالای برگ مشاهده گردد. با گذشت زمان و تشدید شرایط کمبود