

مهند آميدن حسن زاده

کارشناس مجمع تحقیقات کاربردی و توییدزد


شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی



روش‌های جمع‌آوری بذر

بزدور باید قبل از انتقال به کلکسیون، از نظر رسیدگی و سلامت بررسی شوند. این روش برای جمع‌آوری بزدور گونه‌های گیاهی با شاخ و برگ کوچک و بزدوری که دور از دسترس بوده و دستیابی به آنها تنها از طریق هرس شاخه امکان‌پذیر است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جمع‌آوری بذر گیاهان روش‌های متعددی داشته و مناسب‌ترین روش بر اساس گونه گیاهی انتخاب می‌گردد. این مطلب، اطلاعاتی در خصوص رایج‌ترین روش‌های قابل استفاده در احداث کلکسیون بذری با ماندگاری بالا و با مقدار کافی جهت ذخیره‌سازی طولانی مدت ارائه می‌دهد.



برداشت دست چین میوه کامل

چیدن و یا برداشت دستی، اصلی‌ترین روش جمع‌آوری بزدور در گیاهان مشمر می‌باشد. این روش زمانی مناسب است که رسیدگی میوه‌ها یکنواخت نباشند. این تکنیک برای ایجاد کلکسیون‌های بذری کوچک مناسب است.

روش هرس کردن

این روش برای جمع‌آوری بذر (درون میوه) که در انتهای شاخه‌های درختان تشکیل می‌شوند کاربرد داشته و معمولاً از قیچی‌های دسته بلند برای قطع شاخه‌ها استفاده می‌شوند.

کاربرد دارد که بذر گیاه مورد نظر کمیاب و جمع آوری آن با روش های دیگر غیر ممکن باشد.

ظروف جمع آوری

بذور جمع آوری شده را می توان به وسیله سطل، کيسه های کاغذی و یا پارچه ای به بانک بذر منتقل نمود. هیچگاه نباید از کيسه های پلاستیکی برای انتقال بذر استفاده شود. نمونه های جمع آوری شده بایستی تمیز و پس از اطمینان از یکسان بودن گونه گیاهی، با هم ترکیب و به ظروف نگهداری منتقل گردند. هر یک از ظروف بانک بذر بایستی مهر و موم و با برچسب کد گذاری شوند.



داده ها

فواید احداث یک بانک بذر، بدون در دست داشتن داده های درست، چندان مشهود نخواهد بود. بذر جمع آوری شده باید با کلیدهای موجود، شناسایی و تائید شود. همچنین سابقه ای از گونه های گیاهی موجود در بانک و مقدار هر یک از آنها بایستی ثبت و نگهداری گردد. این اطلاعات توسط مدیران حوزه بذر مورد استفاده قرار می گیرد.

گاهی تکان دادن دقیق شاخه ها سبب خروج بهترین بذور خواهد شد. بنزور گیاه مورد نظر باید با ضربات آهسته از غلاف جدا گردد. جهت خارج کردن بنزور، میوه های رسیده به آرامی تکان داده می شوند تا از بنزور خراب و یا نارس جدا شوند. تکان های شدید ممکن است منجر به آسیب دیدن گیاه میزبان گردد. این روش برای جمع آوری میوه های شکوفا با بنزور بزرگ، مناسب و برای گیاهانی با بنزور سبک (به دلیل جایه جایی با وزش باد)، نامناسب است.

چیدن خوش

چیدن خوش عمومی ترین روش جمع آوری بذر از گیاهان علفی است. در این روش ممکن است تعدادی از بذور نارس نیز وارد کلکسیون گردد. بنابراین بهتر است برداشت، پس از رسیدگی کامل خوشها انجام شود. این تکنیک در کشت های متراکم فاقد علف هرز و با انتخاب تک بوته های خاص مورد استفاده قرار می گیرد.

جمع آوری از سطح زمین

معمولا در خاک سطحی زیر درختان و درختچه ها، بذور گیاه قابل مشاهده است. این بذور ممکن است برای ماههای متوالی در سطح زمین قرار گرفته و اغلب آنها درنتیجه حمله حشرات و قارچ ها، آلوده و خراب شوند. اگر چنین بذری به کلکسیون منتقل گردد موجب کاهش قوه نامیه سایر بذور خواهد شد. بنابراین قبل از انتقال، باید پوشش بذر به دقت بررسی گردد. این روش تنها زمانی