



مهندس رضا پور مهدی علمدارلو

کارشناس مجتمع تحقیقات کاربردی و تولید بذر  
شرکت توسعه کشت دانه های روغنی

## آفات مهم آفتابگردان

نحوه مبارزه با آفت							مرحله رشدی آفتابگردان
	دانه بندی (R7-R8)	گل دهی (R5-R6)	غچه مدهی (R2-R3)	چند برگی (Vn)	چهار برگی (V4)	کوتیلدونی (VE)	
شخم عمیق و بخ آب زمستانه، استفاده از طعمه مسموم و یا سمپاشی با سم دورسبان در انتهای روز					<i>Agrotis segetum</i>		لارو طوقه بر
شخم عمیق، تنظیم تاریخ کشت، کنترل آفت در صورت نیاز با یکی از سوم دورسبان، دسیس و یا کنفیدور		<i>Zygogramma exclamacionis</i>					سوسک آفتابگردان
کنترل آفت با سوم پرمیکارب (پریمور)، ایمیداکلوبیراید (کنفیدور)، تیمار بذر با سوم ایمیداکلوبیراید (گاچو) و تیامتوکسام (کروزر)			<i>Aphis glycines, Aphis gossypii</i>				شته ها
جهت کنترل آفت می توان از کنه کش های مختلف مانند برومیکوپلات (نیورون) و هگزی تیازو کس (نیسورون) استفاده نمود		<i>Tetranychus urticaea</i>					کنه دو نقطه ای
مبارزه شیمیایی با سوموی مثل پیری بروکسی فن (آدمیرال)، ایمیداکلوبیراید (کنفیدور)، اسپیرومسین (ابرون) ...		<i>Bemisia tabaci</i>					محسن سفید
کنترل آفت در مراحل اولیه لاروی با استفاده از سومو تیودیکارب (لازوین)، ایندو کسا کارب (آوات) ...				<i>Spodoptera spp, Plusia gamma</i>			لاروهای برگ خوار
شخم زمستانه، تنظیم تاریخ کشت، استفاده از سوم دورسبان یا دسیس در ابتدای ظهور آفت		<i>Cylindrocopturus adspersus</i>					سرخرطومی ساقه
شخم عمیق و بخ آب زمستانه، در صورت نیاز سمپاشی با دیازینون یا تری کلروفن (دیپترکس) در اوایل گلدهی، زبرور برآکرن		<i>Homoeosoma nebulella</i>					لارو دانه خوار
تنظیم تاریخ کشت، کاربرد سوم دورسبان یا لاماداسی هالوترين (کاراهه زنون) در ابتدای ظهور آفت		<i>Smicronyx spp</i>					سرخرطومی بذر
گنجشک پران، دور کننده های صوتی یا شیمیایی و ...	Birds				Birds		پرندگان