



مهندس رضاپور مهدی علمدارلو  
کارشناس مجتمع تحقیقات کاربردی و تولید بذر  
شم کت توسعه کشت دانه های روغنی

خیزندام

سال ۱۳۹۵ - شماره ۶

مدیریت علف‌های هرز آفتابگردان

میزان صرف در هектار	علف کشتهای مورد استفاده و							
		قبل از کاشت (مخبوط با خاک)		قبل از سبز شدن		بعد از سبز شدن		
موثر	نسبتاً موثر	می‌افز	نامشخص	آب و هوایی خشک در بهار توصیه نمی‌شود، مگر اینکه بارندگی شده و یا آبیاری انجام شود.	سباهشی ضروری است و در شرایط آب و هوایی خشک در بهار توصیه نمی‌شود، مگر اینکه بارندگی شده و یا آبیاری انجام شود.	سباهشی ضروری است و در شرایط آب و هوایی خشک در بهار توصیه نمی‌شود، مگر اینکه بارندگی شده و یا آبیاری انجام شود.	سباهشی ضروری است و در شرایط آب و هوایی خشک در بهار توصیه نمی‌شود، مگر اینکه بارندگی شده و یا آبیاری انجام شود.	سباهشی ضروری است و در شرایط آب و هوایی خشک در بهار توصیه نمی‌شود، مگر اینکه بارندگی شده و یا آبیاری انجام شود.
۰-۱	<i>Abutilon theophrasti</i>	تاج خروس و خسی						
۱-۲	<i>Amaranthus retroflexus</i>							
۲-۳	<i>Chenopodium album</i>	سلمنک						
۳-۴	<i>Solanum nigrum</i>	تاتجیری						
۴-۵	<i>Physalis angulata</i>	عرسک پستانه برده						
۵-۶	<i>Xanthium strumarium</i>	طلوق						
۶-۷	<i>Gailum aparine</i>	بسی نی راج						
۷-۸	<i>Datura stramonium</i>	تابوره						
۸-۹	<i>Convolvulus arvensis</i>	پیچک صحراوی						
۹-۱۰	<i>Cyperus spp</i>	اوبارسلام						
۱۰-۱۱	<i>Sorghum halepense</i>	قیاق						
۱۱-۱۲	<i>Echinochloa crus-galli</i>	سوروف						
۱۲-۱۳	<i>Setaria viridis</i>	چیسک						
۱۳-۱۴	<i>Cynodon dactylon</i>	مرغ						