



مهندس رضا پور مهدی علمدارلو  
کارشناس مرکز تحقیقات کاربردی و نوآوری پذیر  
شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی

## علف‌های هرز مهم گلرنگ

مدیریت تلفیقی علف‌های هرز	بعد از سبز شدن				قبل از سبز شدن			علف‌کشی‌های مورد استفاده و میزان مصرف در هکتار
	سلکت سوپر (کلودم) ۰/۱ لیتر	فوکوس (سیکلوكسیدم) ۲ لیتر	گالانت سوپر (فالوکسی فوب آرسنیل اس) ۰/۷۵ لیتر	گالانت (فالوکسی اتل) ۲/۵ لیتر	استامب	سنکور (پندی مالین) ۰/۷۵ لیتر	ترفلان (تریفلورالین) ۰/۲۵ لیتر	
-استفاده از پذر سالم و گواهی شده و فاقد پذر علف‌های هرز								Glycyrrhiza glabra
-تاریخ کشت به موقع								Alhagi camelorum
-عمق کاشت مناسب								Capsella bursa-pastoris
-تراکم کشت مطلوب								Polygonum aviculare
-تابوب زراعی با غلات و کنترل علف‌های هرز (خصوصاً هم خانواده گلرنگ) در زراعت تناوبی								Descuraria sophia
-هیزم کلری (آبیاری زمین قبل از کاشت و کنترل علف‌های هرز سبز شده)								Melilotus officinalis
-استفاده از کولتیواتور در کشت‌های ردبی								Mavla spp.
-استفاده به موقع از علف‌کشها (علف‌کش‌های بعد از سبز شدن بهتر است در مرحله ۲-۶ برگی علف‌های هرز استفاده شود).								بی‌تی راخ
-جهت جلوگیری از ایجاد مقاومت به علف‌کش‌ها، بهتر است در دفعات مختلف نوع سرم مصرفی را تغییر داد.								Fumaria officinalis
	نامشخص	بی‌انر	نسبتاً موثر	موثر				Silybum marianum