

علف‌های هرز کتان Flax seed

رضا پور مهدی علمدارلو

Alamdarlou.r@arc-ordc.ir

کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی، مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر، شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی

بعد از سبز شدن						قبل از کاشت		علف‌کشهای مورد استفاده و میزان مصرف در هکتار	علف‌های هرز کتان
۱۵-۲ تیر	۲۰-۲۵ تیر	۲۵-۳۰ تیر	۳۰-۵ آبان	۵-۱۰ آبان	۱۰-۱۵ آبان	۲۰-۲۵ آبان	۲۵-۳۰ آبان		
سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	خردل وحشی <i>Sinapis arvensis</i>	تلخ، برگ
سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	بنفشه <i>Viola arvensis</i>	
سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	کیسه کشیش <i>Capsella bursa-pastoris</i>	
سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سلمک <i>Chenopodium album</i>	
سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	خاکشیر <i>Descurania sophia</i>	
سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	یونجه زرد <i>Melilotus officinalis</i>	
سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	پنیرک <i>Mavla spp</i>	
سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	بی تی راخ <i>Galium tricorntutum</i>	
سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	آلاله وحشی <i>Ranunculus arvensis</i>	
سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	کنگر برگ ابلق <i>Silybum marianum</i>	
سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	یولاف وحشی <i>Avena fatua</i>	باریک برگ
سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	علف خونی <i>Phalaris minor</i>	
سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	دم روباهی <i>Alopecurus myosyroides</i>	
سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	سبز	چسبک <i>Setaria viridis</i>	
<p>استفاده از بذر سالم و گواهی شده و فاقد بذر علف‌های هرز، تاریخ کشت به موقع، عمق کاشت مناسب، فاصله ردیف کمتر و تراکم کشت مطلوب (بالا تر)، تناوب زراعی و کنترل علف‌های هرز در زراعت تناوبی، هیرم کاری (آبیاری زمین قبل از کاشت و کنترل علف‌های هرز سبز شده)، کنترل موثر و به موقع علف‌های هرز در ابتدای فصل با توجه به کم بودن قدرت رقابت این زراعت، استفاده به موقع از علف‌کشها (علف‌کشهای بعد از سبز شدن بهتر است در مرحله ۲-۶ برگگی علف‌های هرز استفاده شود)، جهت جلوگیری از ایجاد مقاومت به علف‌کشها، بهتر است در دفعات مختلف نوع سم مصرفی را تغییر داد.</p>								مدیریت تلفیقی علف‌های هرز	
نامشخص		بی اثر		نسبتا موثر		موثر			
									